EMICINA LA

La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro de poderosa actividad frete a

la mayoría de las bacterias Gram + y Gram -, protozoos y rickettsias y gérmenes del

grupo PLV (Clamidias).

Es una solución estable preparada especialmente para que, tras su aplicación, los

niveles sanguíneos de antibacteriano persistan durante un periodo de 3-5- días.

Indicaciones:

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas a Pasteurella

multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni y Mycoplasma bovis; metritis

(Arcanobacterium pyogenes) e infecciones entéricas asociadas a Escherichia coli.

Beneficios principales.

Amplio espectro de acción, poderosa actividad

- Su acción perdura a lo largo de de 3-5 días

- Actividad frente a protozoos Rickettsias y gérmenes del grupo PLV

(Clamidias)

Dosis y Administración

- Emicina LA debe ser aplicada por vía intramuscular profunda a la dosis

única de 1 ml por cada 10 kg de peso.

- No inocular más de 10 ml, en un mismo punto.

Observaciones

Tiempo de espera:

Carne: 37 días.

Leche: 7 días.

Mantener preferentemente entre 15°C y 30°C.