

EMICINA

Uso terapéutico: ANTIMICROBIANO

Principio Activo: TERRAMICINA

Especies: Bovinos, Caballos, Caprinos, Porcinos, Aves



Descripción:

EMICINA 100 es un antibiótico de amplio espectro

Composición	Contenido
Terramicina	100 mg
Excipientes csp	1 ml

- **ACCIÓN:** Antibiótico
- **INDICACIONES:** Bovinos: Tratamiento de infecciones del tracto reproductivo, mastitis, cistitis, dermatitis, septicemias, peritonitis, artritis causadas por *E. coli*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Fusobacterium* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp, infecciones respiratorias por *Pasteurella* spp. o *Haemophilus* spp., enteritis colibacilar, neumoenteritis del recién nacido, carbón sintomático, carbón bacteridiano, leptospirosis, actinomicosis, actinobacilosis, campilobacteriosis, shigellosis, pododermatitis, anaplasmosis, queratoconjuntivitis. Porcinos: Indicado en rinitis atrófica, neumonía enzoótica, pleuroneumonía contagiosa, enteritis colibacilar, síndrome MMA, leptospirosis, dermatitis, artritis, pododermatitis, mastitis, septicemias causadas por *E. coli*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium* spp. Equinos: Complejo respiratorio equino, gurma, colibacilosis, clostridiosis, metritis, mastitis, artritis, peritonitis, septicemias causadas por bacterias sensibles. Ovinos y caprinos: Neumonía, aborto enzoótico, pododermatitis, mastitis, metritis, infecciones del recién nacido, micoplasmosis, abscesos, heridas infectadas, septicemia, carbón sintomático y bacteridiano. Aves: Enfermedad respiratoria crónica complicada, coriza, pasteurellosis, colibacilosis.
- **DOSIS:** Intramuscular, intravenosa, subcutánea, intraperitoneal. Tópica: en forma local, Intravaginal o Intrauterina. **DOSIFICACIÓN:** Bovinos, cerdos y ovinos: 10 mg x kg (1 mL x 10 kg) cada 36 horas. Aves: 1 mL x 2 kg, preferiblemente en la pechuga. Las anteriores dosis se deben administrar por 3 a 5 días.
- **TIEMPO DE RETIRO:** Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La

leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo, no debe darse a consumo humano.

- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** *Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.*
- **MODO DE APLICACIÓN:** *Solución inyectable*