

# FARROWSURE GOLD

**Uso terapéutico:** BIOLÓGICO

**Principio Activo:** VIRUS DE PARVOVIRUS, ERISPELA, LEPTOSPIRA

**Especies:** Porcinos



**Descripción:**

**FARROWSURE GOLD B** es un biológico

Composición
Parvovirus porcino (PPV) y bacterina inactivada conteniendo <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> cepa CN3342, <i>Leptospira bratislava</i> cepa JEZ, <i>L. canicola</i> cepa C-51, <i>L. grippotyphosa</i> cepa MAL 1540, <i>L. hardjo</i> cepa WHO, <i>L. icterohaemorrhagiae</i> cepa NADL (11403), <i>L. pomona</i> cepa T262.

- **ACCIÓN:** Vacuna
- **INDICACIONES:** Vacuna que ayuda en la prevención de la falla reproductiva causada por el parvovirus porcino (PPV), la erisipelosis y la leptospirosis. Para la vacunación de cerdas reproductoras sanas y como una ayuda en la prevención de la falla reproductiva causada por el parvovirus porcino (PPV), la erisipelosis causada por *Erysipelothrix rhusiopathiae* y la Leptospirosis causada por *Leptospira bratislava*, *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae* y *L. pomona*.

Se ha demostrado una duración de la inmunidad de 18 semanas contra *E. rhusiopathiae* después de la segunda vacunación. Los antígenos están inactivados químicamente y se les ha agregado dos adyuvantes, incluyendo el Amphigen®, para intensificar la respuesta inmune.

- **DOSIS:** Aplicar 2 ml por vía intramuscular o subcutánea. Primovacunados: Cachorras y cerdas preñadas: Aplicar dos dosis con intervalo de 3 semanas, de manera que la última dosis sea dada dos semanas antes del parto. Revacunación: Una dosis 15 días antes de cada parto subsiguiente.

*Primerizas: 2 dosis con intervalo de 3 a 5 semanas. Segunda dosis de 2 a 4 semanas antes de la monta, preferible 14 días.*

*Cerdas: 7 a 10 días post-parto. Aplicación segura durante la gestación*

*Sementales/ Machos: 2 dosis antes de empezar reproducción. Revacunar con dosis única cada 6 meses*

- **TIEMPO DE RETIRO:** *No vacunar a los animales dentro de los 21 días anteriores a su sacrificio.*
- **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:** *Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Seguro en cerdas gestantes. Almacene el producto entre 2° y 7°C. Contiene gentamicina como conservador.*

*Se puede presentar inflamación transitoria en el sitio de la inyección y/o inapetencia después de la vacunación. Usar todo el contenido del frasco una vez abierto. Se deben de usar jeringas y agujas esterilizadas para administrar esta vacuna.*

- **MODO DE APLICACIÓN:** *Solución inyectable*