

FOSTERA PCV

FÓRMULA

Cada dosis de 2 ml contiene:

Suspensión inactivada de Circovirus Porcino quimérico Tipo 1 - Tipo 2.

Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.

DESCRIPCIÓN

Vacuna contra el Circovirus Porcino.

Virus inactivado de Circovirus quimérico.

Se ha demostrado una duración de la inmunidad de cuatro meses al administrar una dosis única de 2 ml.

USO



INDICACIONES

Para la vacunación de cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores, como ayuda en la prevención de la viremia causada por el Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2 por sus siglas en inglés) y como ayuda en el control de la depleción linfoide causada por el Circovirus Porcino Tipo 2.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

Administrar asépticamente una dosis única de 2 ml intramuscularmente en cerdos de 3 semanas de edad o mayores.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- No vacunar 21 días antes del sacrificio.
- Agitar perfectamente antes de usar.
- Usar todo el contenido del frasco una vez abierto.
- Contiene gentamicina y timerosal como agentes conservadores.
- Puede ocurrir inflamación transitoria en el sitio de inyección después de la vacunación.
- Incinerar el envase y todo el contenido que no se haya utilizado.
- Permitir que el producto alcance la temperatura ambiente.

- Pueden presentarse de manera esporádica reacciones alérgicas. El antídoto es la epinefrina.
- Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

- No exponer a la luz solar. Almacenar entre 2° y 7°C.
- No congelar este producto.
- Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.