

PILOCARPINA

COMPOSICIÓN: SOLUCIÓN INYECTABLE

Pilocarpinio Clorhidrato	2 g
Vehículo estabilizante	100 c.c.

PROPIEDADES:

El principio activo pertenece al grupo farmacológico de los productos bagotónicos simpaticomiméticos, con sus propias y variadas acciones sobre la fisiología animal, de las mismas que para el caso nos interesa, en el campo de la Medicina Veterinaria, la actividad especialmente sobre el sistema digestivo.

La administración de Pilocarpina en animales, está indicada especialmente basado en la facultad que tiene de provocar una mayor peristalcia, aumento del tono y del ritmo intestinal, con incremento de las secreciones gastrointestinales. Por las actividades antes indicadas, con la administración de Pilocarpina, se consigue evacuaciones rápidas, vaciamiento del contenido intestinal y un más rápido desplazamiento del contenido gástrico; por lo mismo es recomendado para la solución de los problemas de empastamiento y acúmulo de contenido digestivo, que generalmente causa cólicos, timpanismo e indigestión especialmente en rumiantes y equinos.

Otra de las actividades señaladas de este producto es la estimulante de la musculatura del útero, colaborando con el incremento de las contracciones del mismo que facilitan el trabajo del parto, así como para el post parto, permitiendo eliminar el contenido uterino; debiendo previamente conseguirse a través de medios físicos o químicos la dilatación del cuello uterino. Es menester indicar también que para otras especialidades de la Medicina Veterinaria, se puede utilizar como colirio ocular por su actividad midriática.

INDICACIONES:

Especialmente indicado en los casos de empastamientos y sobrecarga gastrointestinal, con producción de gases y de cólicos, especialmente en bovinos y caballos.

En el campo ginecológico, una vez establecido el trabajo de parto, como estimulante de las contracciones uterinas y para evacuación de residuos después del parto.

Las otras indicaciones propias de este medicamento están a opción del Médico Veterinario.

DOSIS:

Se recomienda como dosis máxima 5 c.c por vía subcutánea.

En animales de mayor delicadeza como son los caballos, se recomienda esta dosis dividida en por lo menos dos inyecciones de 2 y 3 c.c, a un intervalo no menor de 10 minutos.

Para animales menores relaciónese la dosis según el peso. Puede administrarse tentativamente 0.5 a 1c.c siempre vía subcutánea.

Es necesario indicar que la Pilocarpina causa saliveo y sudoración, circunstancia que es propia del producto y que desaparece en pocos minutos.