

VACA CAIDA CALCIO GLUCONATO

Solución Inyectable

VACA CAÍDA

CALCIO GLUCONATO



Solución
Inyectable



FORMULACIÓN VACA CAÍDA



ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

Nombre: Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V.

Dirección: 31 av. Sur, N° 232, Colonia Cucumacayán. San Salvador, El Salvador.

N° de Registro Oficial: 96-204

Responsable Técnico: Licda. María Encarnación Gutiérrez

Profesión: Químico Farmacéutico

COMPOSICIÓN

Fórmula para 100 mL

Calcio Gluconato 20 g

Excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES DE USO

Se usa como fuente terapéutica de calcio en muchos tipos de deficiencia, como en la paresia de la vaca parturienta.

- Raquitismo.
- Osteomalacia.
- Síndrome de la vaca caída (fiebre de leche).
- Falta de crecimiento en animales tiernos.
- Deficiente producción de leche.
- Enfermedad del parto en la oveja.

CATEGORIA DE USO OFICIAL

Producto de Libre Venta en El Salvador.

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO:

MAG: 95-06-965

ESPECIES DE DESTINO

- Bovinos.
- Ovinos.
- Porcinos.

VIAS DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACION O UTILIZACION DEL PRODUCTO

Producto que puede ser utilizado por cualquiera de las vías que a continuación se mencionan:

- Endovenosa.
- Intramuscular.
- Intraperitoneal.
- Subcutánea.

Según indicación del médico veterinario.

DOSIFICACION

Dependiendo del criterio profesional, del caso a tratar y el peso del animal, las dosis recomendadas son:

Bovinos: Administrar 200 a 250 mL de CALCIO GLUCONATO (Equivalente a 40 g - 50 g de Gluconato de calcio)

Ovinos: Administrar 25 a 50 mL de CALCIO GLUCONATO (equivalente a 5-10 g de Gluconato de calcio).

Porcinos: Administrar 50 a 100 mL de CALCIO GLUCONATO (equivalente a 10-20 g de Gluconato de calcio).

CONTRAINDICACIONES/ LIMITACIONES DE USO DEL PRODUCTO

Estados que causan hipercalcemia:

- Hipercalcemia humoral de tumores malignos o pseudohiperparatiroidismo (causado por adenocarcinoma de las glándulas apócrinas del saco anal, carcinoma escamoso del estómago, linfoma maligno o adenocarcinoma de la glándula mamaria).
- Estados de hiperparatiroidismo primario.
- Hipercalcemia por intoxicación por vitamina D.
- Calcinosis enzoótica (patología de rumiantes y caballos causado por envenenamiento por plantas o desequilibrio mineral que causa calcificación extensa de los tejidos blandos).
- Neoplasias malignas con metástasis óseas.

PRECAUCIONES:

Al administrarse por vía intravenosa debe hacerse de forma lenta y de ser posible, utilizando equipo de venoclisis ya que podría causar paro cardíaco si se lo hace de forma rápida. Debe tomarse en cuenta que la inyección intramuscular puede resultar dolorosa.

PERIODO DE RETIRO:

No corresponde.

PRESENTACIONES

Frascos de 100 mL

Frascos de 250 mL

Frascos de 500 mL

La solución está contenida en frasco plásticos transparentes de polietileno de alta densidad, los cuales van identificados con una etiqueta autoadhesiva, que contiene toda la información necesaria para la correcta administración del producto. Como medida de seguridad y protección del mismo, todo el frasco lleva una película plástica adherida.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar seco, fresco, a una temperatura entre 15 - 30°C, protegido de la luz solar.

PERIODO DE VALIDEZ

3 años a partir de la fecha de elaboración.