



FICHA TECNICA DEL INSECTICIDA ZAPADOR 0.3 GR

INSECTICIDA - PHENYLPYRAZOLE
FIPRONIL

- ☐ **CLASE** INSECTICIDA
- ☐ **INGREDIENTE ACTIVO** FIPRONIL
- ☐ **CONTENIDO** 3 gr. de I.A./kilogramo de producto comercial
- ☐ **GRUPO QUIMICO** PHENYLPYRAZOLE
- ☐ **FORMULACION** GRANULADO
- ☐ **ESTADO FISICO** SOLIDO
- ☐ **REGISTRO MAGA** 130 – 38
- ☐ **EMPRESA REGISTRANTE** PROMOAGRO, S.A.

MODO DE ACCION: ZAPADOR 0.3 GR : Insecticida de contacto e ingestión que actúa en el sistema nervioso del insecto a nivel de ácido gama aminobutírico sobre los iones cloro, en el sistema nervioso central. No tiene efecto sobre la acetilcolinesterasa por lo que resulta activo sobre insectos resistentes a los carbamatos, ciclodieno y piretroides.

RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala, El Salvador

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS kg / ha
Arroz <i>Oryza sativa</i>	barrenador del brote (<i>Chilo infuscatellus</i>) Barrenador de la caña de raíz (<i>Emmalocera depressella</i>) Barrenador del tallo del arroz (<i>Scirpophaga incertulas</i>)	16 - 25
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Saltamontes marrón (<i>Nilaparvata lugens</i>) Cecidómido (<i>Orseolia oryzae</i>)	25 - 33
Césped (<i>Cynodon</i> spp., <i>Paspalum</i> spp.)	Hormiga de fuego (<i>Solenopsis</i> sp.) Grillo topo (<i>Scapteriscus</i> spp.) Hormiga (<i>Lasius neoniger</i>)	19



ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Arroz: 15 - 20 días después del trasplante utilizando un aplicador granulado o un dispensador mecánico, mantener de 2 a 3 cm de agua apozada de 2-3 días después de la aplicación.

Caña de azúcar: aplicar a zanjales antes de cubrir el suelo.

Césped: efectuar un riego posterior a la aplicación de aproximadamente 0.5 cm, para que los gránulos se depositen en la superficie del suelo. No efectuar riego después de la aplicación, utilizar aplicador de gránulos o un dispensador mecánico para realizar la aplicación.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: La frecuencia de la aplicación dependerá de la reinfestación de las plagas.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: 21 días.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 3 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se siguen las recomendaciones dadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: compatible con fertilizantes o plaguicidas, incluyendo los herbicidas. Sin embargo, no debe mezclarse con ningún producto de fuerte reacción alcalina, como cal o amoníaco anhidro, ya que el ingrediente activo puede degradarse. En caso de que sea necesario mezclar este producto, se debe hacer solamente con productos autorizados. No obstante en caso de dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas.

AVISO DE GARANTÍA: El vendedor garantiza la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta. El comprador asume el riesgo para personas o bienes derivados del uso o manejo de este producto y acepta el producto bajo esas condiciones.