

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



CYPER ONE 25 EC

INSECTICIDA – PYRETROIDE
CYPERMETHRIN



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 0.95 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: CYPER ONE 25 EC es un insecticida piretroide de amplio espectro, es un producto muy activo que actúa por contacto, ingestión y estomacal.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

El equipo de aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento sin fugas y bien calibrado. CYPER ONE 25 EC puede ser aplicado con equipo manual, terrestre. En aplicaciones terrestres use un volumen de caldo de 400 L/ha ó 280 L/mz. Utilice boquillas de cono hueco. El producto no ejerce acción física o química sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para realizar la mezcla utilice el equipo de protección recomendado para el manejo de plaguicidas: botas, mascarilla, anteojos y guantes. Verter la mitad de agua en la aspersora, tonel o tanque mezclador. Agregue la dosis de CYPER ONE 25

EC recomendada y mezcle constantemente. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla. Después de terminar la labor de aplicación es necesario lavar el equipo y darle mantenimiento adecuado.



RECOMENDACIONES DE USO: NICARAGUA

CULTIVO	PLAGAS QUE CONTROLA	DOSIS L/ha. L/mz.
Repollo: <i>Brassica oleracea</i> var <i>capitata</i>	Gusano bellotero <i>Heliothis zea</i>	0.16-0.35 L/ha, 0.11-0.25 L/mz
Tomate: <i>Lycopersicon esculentum</i>	Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>	0.16-0.35 L/ha, 0.11-0.25 L/mz
Lechuga: <i>Lactuca sativa</i>	Gusano soldado <i>Spodoptera ornithogalli</i>	0.16-0.35 L/ha, 0.11-0.25 L/mz
Arroz: <i>Oryza sativa</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> , Pulgones <i>Mocis spp</i> y <i>Epitrix spp</i>	0.1-0.2 L/ha, 0.07-0.14 L/mz
Papa: <i>Solanum tuberosum</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> , Polilla <i>Scrobipalopsis solanivora</i>	0.1-0.2 L/ha, 0.07-0.14 L/mz
Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Gusano bellotero <i>Heliothis virescens</i> y <i>Heliothis zea</i> , Falso medidor <i>Trichoplusia ni</i> , Medidor de la hoja <i>Bucculatrix thurberiella</i> , Gusano medidor Alabama argillacea, Picudo <i>Anthonomus grandis</i>	0.16-0.35 L/ha, 0.11-0.25 L/mz
Cítricos (<i>Citrus spp</i>)		
Cultivo de Flores	Escama purpura <i>Lepidosaphes beckii</i> , Escama fina	0.16-0.35 L/ha, 0.11-0.25 L/mz

<p>Papaya: <i>Carica papaya</i></p>	<p>Lepidosaphes gloverii, Escama negra Saissetia oleae, Áfido verde de los cítricos Aphis citricola, Áfido negro del naranjo Toxoptera aurantii</p> <p>Gusano soldado Spodoptera exigua Áfido del crisantemo Macrosiphoniella samborni, Minador de la hoja Liriomyza spp</p> <p>Chicharrita Empoasca spp Mosca blanca Bemisia tabaci</p>	<p>0.2-0.25 L/ha, 0.14-0,175 L/mz un volumen mínimo de 600 L de agua por hectárea</p>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Almacene y transporte el producto en lugares frescos, secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. Inflamable a temperaturas mayores de 50° C, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL”



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN: - GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ÉPOCA DE APLICACIÓN: Papaya: Dos aplicaciones a la protección de la fruta, con intervalo de 4 días. Para los demás cultivos, la época de aplicación va a depender del nivel crítico de la plaga.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Dependerá del nivel crítico de la plaga

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: 8 días para todos los cultivos, excepto en Papaya que son 3 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se recomiendan 24 horas antes de reingresar. En caso de reingresar antes, utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo siguiendo las recomendaciones del panfleto.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Se recomienda una prueba de compatibilidad antes de la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN Dolor de cabeza, náusea, vómito, irritación local, asfixia, vértigo, convulsiones.

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. Seguir tratamiento médico sintomático y de soporte.

