



IVERMECTINA 1% CHINFIELD

Endoparasitíctica y Ectoparasitíctica



Indicaciones: Antiparasitario de amplio espectro contra endoparásitos y ectoparásitos.

Especies de destino: Bovinos.

Posología, dosis y forma de administración:

1 ml cada 50 kpv.

Inyección subcutánea en zonas de piel laxa.

En tabla del cuello preferentemente o por detrás de la paleta.

Tiempo de restricción pre-faena luego de aplicación: 35 días.

Precauciones:

- No aplicar a animales en lactación cuya leche se destine a consumo alimentario humano.
- Evitar condiciones de stress previo a la administración, encierros prolongados y exposición a altas temperaturas por largos períodos de tiempo.
- Tener la certeza de inyección por vía subcutánea.
- En caso de tener que inyectar más de 10 ml, repartir la dosificación en 2 lugares.
No mezclar en la misma jeringa o envases con cualquier otra sustancia ajena al producto.
Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y personas discapacitadas.

Presentación:

Envase multidosis de plástico (polietileno de alta densidad) de 50, 100, 250, 500 ml.

Fórmula:

Ivermectina 1g

Agentes de formulación c.s.p. 100 ml

DEBE SER APLICADO
POR MEDICO VETERINARIO

