



Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquim.com
www.pilarquim.com



PILARSTAR / VIVASTAR 20 SL

GLUFOSINATE AMMONIUM

FICHA TECNICA

FORMULADOR:	PILARQUIM SHANGHAI CO., LTD. 1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai, China.
TIPO DE PRODUCTO	HERBICIDA AGRICOLA
INGREDIENTE ACTIVO	Glufosinato de amonio: 20% p/v (200 gramos de i.a. por L de producto comercial)
Nombre quimico IUPAC	ammonium (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid
FORMULACION	SL (Concentrado soluble)
PROPIEDADES FISICAS/QUIMICAS	Estado Físico: Liquido Color: Azul Densidad: 1.10 g/cc a 20 °C pH: 6.3
INFORMACION GENERAL Y MODO DE ACCION	Es un herbicida no selectivo, de contacto y de amplio espectro y que tiene acción translaminar, que penetra por las hojas de las malezas. Actúa interfiriendo la acción de la enzima glutamina-sintetasa, la cual cataliza la síntesis del aminoácido glutamina.

RECOMENDACIONES DE USO

-Epoca de aplicación: Ver cuadro de cultivos y dosis por país.*

-Forma de aplicación: Se recomienda el uso de aspersora de espalda, y equipo accionado con tractor, es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado. Al momento de preparar la mezcla verificar inicialmente el pH del agua a utilizar en esta. Para un buen funcionamiento se requiere que el pH este entre 5.5 a 7.0. Usar boquillas de abanico. Usar volúmenes de mezcla de 300 a 400 L/Ha para aplicaciones terrestres.

-Periodo de reingreso: 12 horas

-Días a cosecha: 15 días entre la última aplicación y la cosecha.

-Fitotoxicidad y compatibilidad: Por ser un herbicida de contacto y amplio espectro debe aplicarse en forma dirigida a la maleza y no al cultivo.

Es incompatible con formulaciones fuertemente alcalinas. Compatible con herbicidas de uso común como Diuron, Oxifluorfen, Pendimetalina y 2,4-D tomando en cuenta realizar pruebas de eficacia antes de aplicación.

Otras consideraciones a tomar en cuenta:

- Evite la deriva a cultivos vecinos.



Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquim.com
www.pilarquim.com



RECOMENDACIONES DE USO PARA NICARAGUA:

Cultivos	Malezas a controlar	Dosis	Observaciones
Maíz - <i>Zea mays</i> . Caña de azúcar - <i>Saccharum officinarum</i> .	HOJA ANCHA: Bledo - <i>Amaranthus spinosus</i> . Verdolaga - <i>Portulaca oleracea</i> . Culantrillo - <i>Mollugo verticillata</i> Lechosa - <i>Chamaesyce hirta</i> GRAMINEAS: Zacate pata de gallina - <i>Eleusine indica</i> . Plumilla - <i>Leptocloa filiformis</i> CIPERACEAS: Coyolillo - <i>Cyperus rotundus</i> ,	1,25 -1,75 L/Ha	Primera aplicación en preemergencia al cultivo (momento de siembra) cuando la maleza tiene unos 20 cm de altura. Segunda aplicación dirigida a los 25 después de la siembra del cultivo (DDS) si fuere necesario
Palma aceitera - <i>Elaeis guineensis</i>	GRAMÍNEAS: Para - <i>Brachiaria spp</i> Arrocillo - <i>Echinochloa spp</i> Pata de gallina - <i>Eleusine indica</i> Plumilla - <i>Leptochloa spp</i> Bermuda - <i>Cynodon dactylon</i> CIPERACEAS: Coyolillo - <i>Cyperus rotundus</i> Navajuela - <i>Scleria melaleuca</i> Coquito - <i>Cyperus ferax</i> HOJA ANCHA: Dormidera - <i>Mimosa pudica</i> Escobillo - <i>Sida acuta</i> Pega Pega - <i>Desmodium tortuosum</i> Bledo - <i>Amaranthus spinosus</i> Hierba Magdalena - <i>Caperonia palustres</i> Verdolaga - <i>Portulaca oleracea</i> Hierba de pollo - <i>Commelina difusa</i> Campanilla - <i>Ipomoea tiliácea</i> Campanita - <i>Ipomoea nil</i> Batatilla - <i>Ipomoea indica</i> Singonio - <i>Synгонium wendlandii</i>	1,25 -2,0 L/Ha	



Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquim.com
www.pilarquim.com



Banano y plátano - <i>Musa spp</i>	Bledo - <i>Amaranthus spinosus</i> Verdolaga - <i>Portulaca oleracea</i> Chayotillo - <i>Sicyos deppei</i> Tamarindillo - <i>Phyllanthus niruri</i> Comelina - <i>Commelina benghalensis</i> Mozote - <i>Priva lapulaceae</i> Palo sangre - <i>Croton hirtus</i> Golondrina - <i>Euphorbia hirta</i> Manga larga - <i>Digitaria sanguinalis</i> Leptochloa filiformis - <i>Plumilla</i> Pata de gallina - <i>Eleusine indica</i> Coyolillo - <i>Cyperus rotundus</i>	1,25-2,0 L/Ha	
Café - <i>Coffea arabica</i>	Pasto estrella - <i>Cynodon nlemfuensis</i> Digitaria - <i>Digitaria sanguinalis</i> Arrocillo - <i>Echinochloa colona</i> Zacate de agua - <i>Echinochloa crus-galli</i> Pata de gallina - <i>Eleusine indica</i> Plumilla - <i>Leptochloa sp</i> Coyolillo - <i>Cyperus rotundus</i> Punta blanca - <i>Rhynchospora colorata</i> Pelo de mico - <i>Fimbristylis sp</i> Coyolito - <i>Cyperus esculentus</i> Bledo - <i>Amaranthus sp</i> Aceitillo - <i>Bidens pilosa</i> Tabaquillo - <i>Richardia scabra</i> Hierba de pollo - <i>Commelina difusa</i> Lechuguilla - <i>Emilia sonchifolia</i> Golondrina - <i>Euphorbia hirta</i> Ortiga - <i>Fleurya aestuans</i> Campanilla - <i>Ipomoea sp</i> Cordoncillo - <i>Piper marginatum</i> Verdolaga - <i>Portulaca oleracea</i> Flor Amarilla - <i>Melampodium divaricatum</i> Escobilla - <i>Sida acuta</i>	1,25-2,0 L/Ha	

RECOMENDACIONES DE USO PARA PANAMA:

Cultivo (s):	Maleza (s): que controla	Dosis (L/Ha)	Epoca de Aplicación:
Cítricos (<i>Citrus sp.</i>)	Digitaria - <i>Digitaria sanguinalis</i> . Arrocillo - <i>Echinochloa colona</i>	1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Cola de zorro - <i>Setaria spp.</i> Pasto Honduras- <i>Ixophorus unisetus</i> .	1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura
Maiz (<i>Zea mays</i>)	Caminadora - <i>Rottboellia cochinchinensis</i> .		
Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)	Pata de gallina- <i>Eleusine indica</i> . Grama común- <i>Cynodon dactylon</i> .	1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicar en momento de la siembra, a los 30 dds y al momento de doblaje del cultivo si fuera necesario (no hacer mas de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo)
Caña de azucar		1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura



Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquim.com
www.pilarquim.com



(<i>Saccharum officinarum</i>)	Coyolillo - <i>Cyperus</i> sp. Zacate Johnson- <i>Sorghum halepense</i> .		
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> .) Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Bledo - <i>Amaranthus</i> spp. Verdolaga - <i>Portulaca</i> spp. - Mozote - <i>Bidens pilosa</i> Hierba de pollo - <i>Commelina</i> spp. Campanilla - <i>Ipomoea</i> spp. Hierba mora - <i>Solanum nigrum</i> .	1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)		1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura
Melon (<i>Cucumis melo</i>) Sandia (<i>Citrullus</i> sp.) Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)		1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura
Hortalizas en presiembr		1.5 - 2.0 L/Ha	Aplicación en presiembr y aplicación dirigida cuando la maleza tiene 20 cm de altura

RECOMENDACIONES DE USO PARA HONDURAS:

Cultivos	Malezas a controlar	Dosis	Observaciones
Maíz - <i>Zea mays</i> . Caña de azúcar - <i>Saccharum officinarum</i> .	Acuate - <i>Lagascea mollis</i> Alternantera - <i>Alternanthera</i> sp. Arrocillo - <i>Echinochloa colona</i> Bledo - <i>Amaranthus spinosus</i> Botón Blanco - <i>Melanthera nivea</i> Botoncillo - <i>Richardia scabra</i> Camaroncillo - <i>Blechum</i> sp. Caminadora - <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Campanilla - <i>Ipomoea</i> sp. Cangrejillo - <i>Murdania nudiflora</i> Capin - <i>Echinochloa crus-galli</i> Cerrajilla - <i>Erechtites valerianaefolia</i> Chayotillo - <i>Sicyos deppei</i> Chiquizacillo - <i>Mitracarpus</i> sp. Cinquillo - <i>Drymaria cordata</i> Clavelillo - <i>Emilia fosbegii</i> Comalillo - <i>Hydrocotyle umbellata</i> Commelina - <i>Commelina benghalensi</i> Correhuela - <i>Convolvulus arvensis</i>	1,25 a 1,75 L/Ha	Primera aplicación en preemergencia al cultivo (momento de siembra) cuando la maleza tiene unos 20 cm de altura. Segunda aplicación dirigida a los 25 después de la siembra del cultivo (DDS) si fuere necesario



Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquim.com
www.pilarquim.com



1961-2021

Palma de aceite - Elaeis guineensis	Coyolillo - Cyperus esculentus Coquito - Cyperus ferax Culantrillo - Mollugo verticillata Dormidera - Mimosa pudica Epazote cenizo - Chenopodium bernaldieri Escobilla - Sida acuta Escobillo - Sida rhombifolia	1,25- 2,00 L/Ha	Aplicación dirigida a la maleza cuando esta tiene 20 cm de altura
Banano y plátano - Musa spp.	Estrella blanca - Rhynchospora colorata Falso jazmín - Solanum jasminoides Flor amarilla - Melampodium divaricatum	1,25 – 2,00 L/Ha	
Forestales	Frijolillo - Senna obtusifolia Golondrina - Euphorbia hirta Gramilla - Cynodon dactylon		
Café - Coffea sp.	Hierba magdalena - Caperonia palustris Hierba de pollo - Commelina leiocarpa Hierba tripa de pollo - Commelina diffusa	1,25 – 2,00 L/Ha	
Cacao - Theobroma cacao	Junquillo - Fimbristylis sp Lechosa - Chamaesyce hirta		
Arroz - Oryza sativa	Lechuguilla - Emilia sonchifolia Lengua de vaca - Rumex crispus Lombricilla - Peperonia pellucida Manga larga - Digitaria sanguinalis L Mielcilla - Galinsoga sp. Moriseco - Bidens pilosa Mozote - Priva lapulaceae Navajuela - Scleria spp	1,5 - 3,0 L/ha	
Aguacate - Persea americana	Oreganillo - Cuphea sp. Palo sangre - Croton hirtus Para - Brachiaria spp Pasto estrella - Cynodon nlemfuensis Pastorcita - Euphorbia heterophylla Pata de gallina - Eleusine indica L Pega pega - Desmodium tortuosum Pica-pica - Fleurya aestuans	1,5 - 2,8 L/ha	
Lima - Citrus latifolia Limón - Citrus limon Mandarina - Citrus reticulata Naranja - Citrus sinensis Pomelo - Citrus paradisi	Pimientilla - Piper marginatum Plumilla - Leptochloa sp. Santa Lucía - Ageratum conyzoides Siempre viva - Commelina diffusa Syngonio - Syngonium wendlandii Tamarindillo - Phyllanthus sp. Tomatillo - Physalis floridana Verdolaga - Portulaca oleracea Zacate cadillo - Cenchrus echinatus Zacate casamiento - Eragrostis mexicana Zacate guinea - Panicum maximun	2,0 - 3,3 L/ha	



Pilarquin (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquin.com
www.pilarquin.com



1961-2021

Yuca <i>Manihot</i> <i>esculenta</i>	-	Zacate Johnson - <i>Sorghum</i> <i>halepense</i>	2.00 L/Ha
Helecho Hoja de Cuero - <i>Rumohra</i> <i>adiantiformis</i>	-		1.25 – 2,00 L/Ha
Melon <i>Cucumis melo</i>	-		
Piña - <i>Ananas</i> <i>comosus</i>	-		
Okra <i>Abelmoschus</i> <i>esculentus</i>	-		
Papa <i>Solanum</i> <i>tuberosum</i>	-		

RECOMENDACIONES DE USO PARA BELIZE:

CROP	PEST	DOSE	OBSERVATIONS
Maize – <i>Zea mays</i> .	Nutsedge – <i>Cyperus rotundus</i> Mexican Grass – <i>Eragrostis</i> <i>mexicana</i> Silk leaf – <i>Lagascea mollis</i> Purselane – <i>Portulaca oleraceae</i> Johnson grass – <i>Sorghum halepense</i> Pigweeds – <i>Amaranthus spp.</i> Green carpetweed – <i>Mollugo verticillata</i> Hairy Spurge – <i>Euphorbia hirta</i>	1.5 – 3.0 L/Ha	First pre-emergence application to the crop (sowing time) when the weed is about 20 cm high. Second application directed at 25 after sowing the crop (DDS) if necessary

Sugarcane – <i>Saccharum officinarum</i>.	Milky weed – <i>Euphorbia heterophylla</i> Morning glory – <i>Ipomoea purpurea</i> Small canary grass – <i>Phalaris minor</i> Parthenium – <i>Parthenium hysterophorus</i> Sour grass – <i>Paspalum conjugatum</i> Itchgrass – <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Indian Goosegrass – <i>Eleusine indica</i> Red Sprangletop – <i>Leptochloa filiformis</i> Coco Grass – <i>Cyperus rotundus</i> Bamboo grass – <i>Panicum fasciculatum</i> Lobed croton – <i>Croton lobatus</i>	1.5 – 3.0 L/Ha	Make a targeted application to the weed
Coffee - <i>Coffea arabica</i>	African Bermuda-grass - <i>Cynodon nlemfuensis</i> Hairy Crabgrass - <i>Digitaria sanguinalis</i> Jungle rice - <i>Echinochloa colonum</i> Cockspur - <i>Echinochloa crus-galli</i> Indian Goosegrass - <i>Eleusine indica</i> Red Sprangletop - <i>Leptochloa spp</i> Coco grass - <i>Cyperus rotundus</i> Star Sedge - <i>Rhynchospora colorata</i> Fimbry - <i>Fimbristylis spp</i> Pigweed - <i>Amaranthus spp.</i> Hairy Beggarticks - <i>Bidens pilosa</i> Rough mexican clover - <i>Richardia scabra</i> Spreading Dayflower - <i>Commelina diffusa</i> Lilac tasselflower - <i>Emilia sonchifolia</i> Hairy spurge - <i>Euphorbia hirta</i> West Indian woodnettle - <i>Laportea aestuans</i> Morning glory - <i>Ipomoea spp</i> Cordoncillo - <i>Piper marginatum</i> Common purslane - <i>Portulaca oleracea</i> Butter daisy - <i>Melampodium divaricatum</i> Common Wireweed - <i>Sida acuta</i>	1.25 – 2.0 L/Ha	Make a application in post directed emergency to the weeds



Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.
for Quality Harvest... Shanghai CHINA

TEL: (+86-21) 5758-9888 (25 Lines)
FAX: (+86-21) 5758-9666
E-mail: sha@pilarquim.com
www.pilarquim.com



Avocado –<i>Persea americana</i>	Lamb's quarters <u><i>Chenopodium berlandieri</i></u> Blue dayweed <u><i>Commelina leiocarpa</i></u> Bur-bur <u><i>Cenchrus echinatus</i></u> Curly dock <u><i>Rumex crispus</i></u> Crab claw <u><i>Physalis floridana</i></u> Hairy Beggarticks <u><i>Bidens pilosa</i></u> Perfoliate Blackfoot <u><i>Melampodium perfoliatum</i></u> Acahual <u><i>Aldama dentata</i></u> Alexandergrass <u><i>Brachiaria plantaginea</i></u> Fingergrass <u><i>Digitaria ciliaris</i></u> Sword grass <u><i>Paspalum virgatum</i></u> Marsh bristlegrass <u><i>Setaria parviflora</i></u>	1.75 – 2.8 L/Ha	Make a targeted application to the weed
Sorgo –<i>Sorghum bicolor</i>	Browntop Signalgrass <u><i>Urochloa fasciculata</i></u> Cockspur <u><i>Echinochloa crus-galli</i></u> Alexandergrass <u><i>Brachiaria plantaginea</i></u> Feather finger grass <u><i>Chloris virgata</i></u> Grisebach's bristlegrass <u><i>Setaria grisebachii</i></u>	1.5 – 3.0 L/Ha	Make a application in post directed emergency to the weeds

Citrus <i>Citrus spp.</i>	Pega-pega – <u><i>Achyranthes indica</i></u> Bindweed – <u><i>Convolvulus arvensis</i></u> Jungle rice – <u><i>Echinochloa colona</i></u> Guinea grass – <u><i>Panicum maximum</i></u> Sicklepod – <u><i>Senna obtusifolia</i></u> Broomweed – <u><i>Sida rhombifolia</i></u> Potato Vine – <u><i>Solanum jasminoides</i></u>	2.0 – 3.3 L/ha	Make one post-emergence application, aimed at active weeds. growth, if you consider it necessary, use screens during application to avoid contact of the spray cloud with cultivation
------------------------------	---	-------------------	--

RECOMENDACIONES DE USO PARA REPUBLICA DOMINICANA:

Cultivos	Malezas a controlar	Dosis L/Ha	Observaciones
Maíz - <i>Zea mays</i> . Caña de azúcar - <i>Saccharum officinarum</i> .	Acuate <i>Lagascea mollis</i> Alternantera <i>Alternanthera sp.</i> <i>Amaranthus spinosus</i> Arrocillo <i>Echinochloa colona</i> Arrocillo <i>Echinochloa crus-galli</i>	1,25 a 1,75 L/Ha	Primera aplicación en preemergencia al cultivo (momento de siembra) cuando la maleza tiene unos 20 cm de altura.
Palma de aceite <i>Elaeis guineensis</i>	Bledo <i>Amaranthus sp.</i> Botón Blanco <i>Melanthera nivea</i> botoncillo <i>Richardia scabra</i>	1-25- 2.00 L/Ha	
Banano y plátano <i>Musasea spp.</i>	<i>Brachiaria spp</i> Camaroncillo <i>Blechnum sp.</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1-25- 2.00 L/Ha	Segunda aplicación dirigida a los 25 después de la siembra del cultivo (DDS) si fuere necesario
Forestales	campanilla <i>Ipomoea sp.</i>		
Café <i>Coffea sp</i> Cacao <i>Theobroma cacao</i>	Cangrejillo <i>Murdania nudiflora</i> <i>Caperonia palustris</i> Cerrajilla <i>Erechtites valerianaefolia</i> Chayotillo <i>Sicyos deppei</i>	1.25 – 2 .00 L/Ha	
Arroz <i>Oryza sativa</i> Maíz <i>Zea mays</i>	Chiquizacillo <i>Mitracarpus sp.</i> Chiquizacillo <i>Spermacoce latifolia</i> Cinquillo <i>Drymaria cordata</i>	1.5-3-0 L/ha	
Aguacate <i>Persea americana</i>	Clavelillo <i>Emilia fosbegii</i> Comalillo <i>Hydrocotyle umbellata</i> Commelina <i>Commelina benghalensis</i> Correuela <i>Convolvulus arvensis</i>	1.5-2.8 L/ha	
Lima Limón <i>Citrus limon</i> Mandarina <i>Citrus reticulata</i> Naranja <i>Citrus sinensis</i> Pomelo <i>Citrus paradisi</i>	Coyolillo <i>Cyperus esculentus</i> Culantrillo - <i>Mollugo verticillata</i> <i>Desmodium tortuosum</i> Epazote cenizo <i>Chenopodium bernaldieri</i> <i>Equinocloa Echinochloa sp.</i> escobilla <i>Sida acuta</i> . Escobilla <i>Sida rhombifolia</i>	2.0-3-3 L/ha	

Yuca <i>Manihot</i> <i>esculenta</i>	Estrella blanca <i>Rhynchospora colorata</i> Falso jazmín <i>Solanum jasminoides</i> Florecilla <i>Melampodium sp.</i> Frijolillo <i>Senna obtusifolia</i> Golondrina <i>Euphorbia hirta</i> Gramilla <i>Cynodon dactylon</i>	2.00 L/Ha	
Helecho Hoja de Cuero Melon <i>Cucumis melo</i> Piña <i>Ananas comosus</i> Okra <i>Abelmoschus esculentus</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Hierba de pollo <i>Commelina leiocarpa</i> hierba tripa de pollo <i>Commelina diffusa</i> Jalacate <i>Melampodium divaricatum</i> Junquillo <i>Fimbristylis sp</i> Lechosa - <i>Chamaesyce hirta</i> lechuguilla <i>Emilia sonchifolia</i> Lengua de vaca <i>Rumex crispus</i> <i>Leptochloa spp</i> Lombricilla <i>Peperonia pellucida</i> Manga larga <i>Digitaria sanguinalis L</i> Mielcilla <i>Galinsoga sp.</i> <i>Mimosa pudica</i> Moriseco <i>Bidens pilosa</i> Mozote <i>Priva lapulaceae</i> Oreganillo <i>Cuphea sp.</i> Palo sangre <i>Croton hirtus</i> pasto estrella <i>Cynodon nlemfuensis</i> Pastorcita <i>Euphorbia heterophylla</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica L</i> Pata de gallina <i>Digitaria sp.</i> Pata de gallo <i>Echinochloa colona</i> Pega pega <i>Achyranthes india</i> pica-pica <i>Fleurya aestuans</i> pimientilla <i>Piper marginatum</i> Plumilla <i>Leptochloa sp.</i> Santa Lucía <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Scleria spp</i> <i>Scleria melaleuca</i> <i>Cyperus ferax</i> Siempre viva <i>Commelina difusa</i> <i>Syngonium wendlandii.</i> Tamarindillo <i>Phyllanthus sp.</i> tomatillo <i>Physalis floridana</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Zacate cadillo <i>Cenchrus echinatus</i> Zacate casamiento <i>Eragrostis mexicana</i> Zacate guinea <i>Panicum maximum</i> Zacate Johnson <i>Sorghum halepense</i>	1.25 – 2 .00 L/Ha	Primera aplicación en preemergencia al cultivo (momento de siembra) cuando la maleza tiene unos 20 cm de altura. Segunda aplicación dirigida a los 25 después de la siembra del cultivo (DDS) si fuere necesario

Nota: Lea detenidamente la etiqueta y panfleto y seguir las instrucciones de uso.

VIENE-2024