

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

T-22 1.15 WP

FUNGICIDA-MICROBIOLÓGICO

Trichoderma harzianum

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

Densidad: 0.52 gr/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA
PIEL POR EXPOSICION.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Es un fungicida biológico sistémico capaz de matar especies diferentes de hongos, basado en la actividad de esporas (conidias) vivas del hongo *Trichoderma harzianum*. Ataca patógenos de la raíz y del follaje antes que usted los detecte. Previene Enfermedades dando protección a la raíz y al follaje. Promueve el crecimiento de pelos absorbentes y raíces alimenticias mejorando la absorción del agua. El ingrediente activo libera compuestos que incrementan la disponibilidad de nutrientes para la planta, esta exento de tolerancia por la EPA y no tiene restricción en el tiempo para reentrar a las superficies tratadas. Ideal para programas de producción orgánica ya que está citado en las listas de la Organic Materials Research Institute (OMRI). No se ha registrado ningún efecto fitotóxico.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Antes de usar el equipo de aspersión revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento y calibrado. Se puede utilizar equipo manual (bombas de mochila y fertirriego). Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco. No es corrosivo a los metales.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR
EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS, MASCARILLA, ANTEOJOS,
GUANTES, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



FORMA Y PREPARACION DE LA MEZCLA:

T-22 1.15 WP contiene sus propios emulsificantes y se mezcla fácilmente con agua homogénea antes de comenzar la aspersión. Añada agua al tanque de mezcla, en una cantidad que permita una agitación óptima. Agite T-22 1.15 WP bien y después añada gradualmente la cantidad necesaria para llenar el tanque, sin dejar de agitar. Finalmente añada el resto del agua. Proporcione la agitación suficiente durante la aplicación para mantener una emulsión uniforme. Prepare solamente la cantidad que vaya a aplicar en ese día. No prepare un día antes de aplicarlo, las esporas se morirán si dejan toda la noche o más horas mezcladas con agua.

RECOMENDACIONES DE USO: Para GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis
Melon (Cucumis melo) Sandia (Citrulus Lanatus), Pepino (Cucumis Sativus) Ejote Frances (Phaseolus vulgaris) Arverja China (Pisum sativum) Mora (Rubus ulmifolius) Fresas (Fragaria sp) Tomate (Solanum lycopersicum) Chile Pimiento (Capsicum Annumm) Café (Coffea arabica) Banano (Musa paradisiaca) Ornamentals Follajes Frutales	Mal del Talluelo Fusarium spp. Phytium sp. Phytophthora sp. Rhizoctonia sp.	150-600g /100 kg (En semillas) 375-750g /100lbs de agua Dosis por litro: 1 a 2 cc por litro

Dosis para aplicación en el Campo : Aplique de 150-600 gramos en 100 kilogramos de semilla y 375 – 750 gramos en 100 litros de agua para aplicaciones foliares de T-22 1.15 WP. Volúmenes excesivos de lluvia lavará el ingrediente activo (esporas), reduciendo la efectividad. Algunas veces las aplicaciones aéreas no dan buena cobertura del envés de las hojas. Los mejores resultados se obtienen con bombas de mochila o motorizadas.

PERIODO DE CARENCIA:

No tiene ninguna carencia. Se puede aplicar antes, durante y después de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espera 4 horas después de la aplicación, para entrar nuevamente al cultivo.

FITOTOXICIDAD:

T-22 1.15 WP No es fitotoxico a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD:

T-22 1.15 WP es incompatible con agroquímicos, cloro y amonio cuaternario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

La prolongada exposición al calor o humedad lo hace perder su eficacia al descomponerse, Guarde y transporte el producto en un lugar lejos de

forrajes, semillas y otros productos agroquímicos o de uso humano. Conserve el producto en su envase original bien etiquetado y cerrado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Puede causar irritación y sensibilización de la piel en ciertos individuos. Puede causar irritación en los ojos. Es dañino si es ingerido

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: Si la persona está consciente y no presenta convulsiones, de a beber suficiente agua por lo menos 15 minutos. No inducir el vómito.

Contacto con la piel:

Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

Inhalación: Retire a la persona del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario dele respiración artificial.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua por 15 minutos. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELEFONO
Centro de Información y	GUATEMALA	2251-3560 y 2332-0735
Asesoría Toxicológica		1-8000-00-29832
Karl Heusner Memorial	BELICE	231-548
Hospital Dr. Hurrisa Hailu		231-639
Centro de Información	EL SALVADOR	2221-0966
Toxicología		Ext. 140
Secretaría de Agricultura y	HONDURAS	232-163
Ganadería, Sanidad Vegetal		
Centro de Toxicología	NICARAGUA	289-7150
Complejo de Salud		Ext. 213
Concepción Palacios		
Centro Nacional de Control	COSTA RICA	8223-1028
de Intoxicaciones		
Centro de Investigación e	PANAMÁ	269-2741
Información de		
Medicamentos Tóxicos		
Hospital Dr. Luis Aybar,	REP	684-3478 y 684-3672
Hospital Dr. Francisco	DOMINICANA	681-2913 y
Moscoso Puello.		681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS , ESTANQUES Y FUENTES DE AGUAS SUBTERRANEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Enjuague triple (o su equivalente) y ofrecerlo luego para reciclaje si lo permite la ley.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA

El formulador garantiza que el contenido de este envase corresponde a la composición especificada en la etiqueta. No se responsabiliza por el uso que de él se haga, lo cual estará a riesgo exclusivo del comprador.

FORMULADO POR:

BioWorks, Inc.

100 Rawson Rd, Suite 205

Victor NY 14564

USA

IMPORTADO POR:

AGROPECUARIA EL ÉXITO Y/O GIRÓN CAMPOS Y CÍA. LTDA.

3ª. av. 5-16 Zona 9 Guatemala. Centroamérica.

País	No. Registro	Fecha Registro
Guatemala	189-7	15-DIC-2016
El Salvador		
Honduras		
Nicaragua		
Costa Rica		
Panamá		
Rep. Dominicana		